Inhaltsverzeichnis Heft 1-14
- alphabetisch nach Autoren
(Hauptartikel, Kurzmitteilungen, Kurzreferate; ohne Buchbesprechungen und Diversa)

Arachnologische Mitteilungen 1 - 14 (1991 - 1997); Basel

Heft 1: 1-95; Aug.1991	Heft 2: 1-48; Dez. 1991
Heft 3: 1-69; Juli 1992	Heft 4: 1-79; Dez. 1992
Heft 5: 1-54; Juni 1993	Heft 6: 1-61; Dez. 1993.
Heft 7: 1-59; Juli 1994	Heft 8: 1-80; Dez. 1994
Heft 9: 1-79; Juli 1995	Heft 10: 1-41; Dez. 1995
Heft 11: 1-58; Aug. 1996	Heft 12: 1-80; Dez. 1996
Heft 13: 1-59; Juli 1997	Heft 14: 1-85, Dez. 1997

BARTHEL, J. (1991): Wiederfunde von *Sosticus loricatus* (Araneae: Gnaphosidae) in Bayern. - Heft 1: 84-85

BAUCHHENSS, E. (1991): Die epigäische Spinnenfauna eines Auwaldgebietes der Donau im Landkreis Dillingen/Donau (Deutschland, Bayern). - Heft 2: 20-30

BAUCHHENSS, E. (1993): *Chalcoscirtus nigritus* - neu für Mitteleuropa (Araneae: Salticidae). - Heft 5: 43-47

BAUCHHENSS, E. (1994): Nachweise von *Euophrys milleri* in Deutschland (Araneae: Salticidae). - Heft 8: 47-48

BAUCHHENSS, E. (1995): Überwinternde Spinnen aus Schneckenhäusern. - Heft 9: 57-60

BAUCHHENSS, E. & H.STUMPF (1992): Wiederfunde von *Ballus rufipes* in Deutschland (Araneae: Salticidae). - Heft 4: 56-58

BAUCHHENSS, E., I.WEISS & F.TOTH (1997): Neufunde von *Zelotes mundus* (KULCZYNSKI, 1897) mit Beschreibung des Weibchens. - Heft 13: 43-47

BAUCHHENSS, E.: s. WEISS, I. 1995

BAUMANN, T., T.BLICK, F.FOECKLER & M.SCHLEUTER (1992): Erstnachweis von *Astrobunus laevipes* und *Nemastoma dentigerum* in Bayern (Opiliones: Phalangiidae, Nemastomatidae). - Heft 3: 58-61

BAUMANN, T., P.SACHER & B.TEICHMANN (1996): Neue Funde von *Lepthyphantes geniculatus* in Sachsen-Anhalt (Araneae, Linyphiidae). - Heft 11: 49-51

BAUMANN, T.: s. KRIŠTÍN, A. 1996

BERGTHALER, G.J. [Autorreferat] (1996): Die Besiedelung einer neugepflanzten Feldhecke durch epigäische Spinnen (Arachnida: Araneae). Ein ökofaunistischer Beitrag zur Kenntnis von Spinnenzönosen agrarwirtschaftlicher Intensivflächen (Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau, Oberösterreich). - Heft 12: 68-69

BELLMANN, H.: s. RATSCHKER, U. 1993

BELLSTEDT, R.: s. SACHER, P. 1997
BEZDĚCKA, P.: s. KLIMEŠ, L. 1995
BLAGOEV, G.: s. DELTSHEV, C. 1994
BLICK, T. (1991): *Bathyphantes eumenis*, neu für Deutschland und Frankreich, sowie *Lepthyphantes notabilis* aus Blockhalden (Araneae: Linyphiidae). - Heft 2: 31-32
BLICK, T. (1994): *Erigonella subelevata*, *Coelotes solitarius* und *Xysticus gallicus* neu für Deutschland, sowie weitere bemerkenswerte Spinnenarten aus dem Berchtesgadener Gebiet (Bayern) (Araneae). - Heft 7: 45-49
BLICK, T., J.FISCHER, R.MOLENDA & I.WEISS (1995): Nachweise von *Clubiona alpicola* in Deutschland und Tschechien (Araneida, Clubionidae). - Heft 9: 26-35
BLICK, T. & K.HAMMELBACHER (1994): *Paranemastoma bicuspidatum*, ein weiterer alpiner Weberknecht in den deutschen Alpen (Opilionida: Nemastomatidae). - Heft 8: 71-72
BLICK, T. & K.HENDRICKS(1995): *Centromerus unidentatus* neu für Deutschland (Araneida: Linyphiidae). - Heft 10: 11-13
BLICK, T. & N.KLAPKAREK (1993): *Neriene hammeni* (Araneae: Linyphiidae) neu für Deutschland. - Heft 5: 39-42
BLICK, T., L.PFIFFNER & H.LUKA (1996): Erstnachweis von *Centromerus capucinus* und *Lepthyphantes insignis* für die Schweiz (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). - Heft 12: 57-60
BLICK, T., T.SAMMOREY & D.MARTIN (1993): Spinnenaufsammlungen im NSG „Großer Schwerin mit Steinhorn" (Mecklenburg-Vorpommern), mit Anmerkungen zu *Tetragnatha reimoseri* (syn. *Eucta kaestneri*), *Theridion hemerobius* und *Philodromus praedatus* (Araneae). - Heft 6: 26-33
BLICK, T. & M.SCHEIDLER(1991): Kommentierte Artenliste der Spinnen Bayerns (Araneae). - Heft 1: 27-80
(unter Mitarbeit von B. BAEHR, J.BARTHEL, E.BAUCHHENSS, H.-J.BECK, P.BECK, H.BELLMANN, D.CORDES, J.FISCHER, O.FISCHER-LEIPOLD, K.H.HARMS, H.KRUMMENAUER, I.KÜHN, D.LEIPOLD, A.LEHNA, R.PLATEN, W. ROSE, G.[GERD] SCHMIDT, G.[GÜNTER] SCHMIDT, V.SLEMBROUCK-WOLF, H.N. STUBBEMANN, H.STUMPF, G.TÖPFER-HOFMANN, H.UHLENHAUT, F.-O.VYTRISAL, D.WEICKMANN-ZWÖRNER)
BLICK, T. & H.SEGERS (1993): Probleme bei *Philodromus*-Arten in Mitteleuropa: *P. aureolus/praedatus* und *P. rufus/albidus* (Araneae: Philodromidae). - Heft 6: 44-47
BLICK, T. & C.SZINETÁR (1996): *Glyphesis conicus* ist ein jüngeres Synonym von *Glyphesis taoplesius* (Araneae: Linyphiidae). - Heft 11: 39-42
BLICK, T.: s. BAUMANN, T. et al. 1991; BLISS, P. et al. 1996; DROGLA, R. 1996; PLATEN, R. et al. 1996; SCHLEGEL, D. 1991
BLISS, P. (1994): *Nelima gothica* - neu für die deutsche Weberknechtfauna (Opiliones: Phalangiidae). - Heft 8: 73-74
BLISS, P., J. MARTENS & T. BLICK [& Mitarbeiter*] (1996): Rote Liste der Weberknechte Deutschlands (Arachnida: Opiliones). - Heft 11: 32-35
BLISS, P.: s. SCHNITTER, P.H. 1991
BRAUN, D. (1992): Aspekte der Vertikalverteilung von Spinnen (Araneae) an Kiefernstämmen. - Heft 4: 1-20
BRAUN, D. (1993): Zur Phänologie und Vertikalverteilung von Weberknechten an Kiefernstämmen. - Heft 5: 33-35

BRAUNSTEIN, W. (1994): Erstnachweis von *Segestria florentina* für Deutschland (Araneae: Segestriidae). - Heft 8: 49-50
BROEN, B.v. (1993): Nachweise selten gefundener oder gefährdeter Spinnen (Araneae) in der Mark Brandenburg. - Heft 6: 12-25
BROEN, B.v. (1994): Spinnen aus Malaisefallen. - Heft 7: 31-40
BROEN, B.v. (1995): Nachweis von *Oxyopes heterophthalmus* für Deutschland (Araneae: Oxyopidae). - Heft 9: 36-37
BROEN, B.v. (1995): Nachweis von *Textrix caudata* für Deutschland. - Heft 10: 14
BRUHN, K., P.SACHER & H.KORGE (1994): Nachweise von *Thanatus vulgaris* in Deutschland (Araneae: Philodromidae). - Heft 8: 51-52
CASEMIR, H.: s. KRAUS, O. 1991
CORDES, D. (1991): Phänologie und Lebenszyklus von Wolfspinnen (Araneae, Lycosidae) auf Wirtschaftswiesen des Altmühltales/Bayern. - Heft 2: 1-19
DELTSHEV, C. & G.BLAGOEV (1994): Biotopical distribution and seasonal activity of model species of the family Gnaphosidae (Araneae) in Zemen gorge (SW Bulgaria). - Heft 7: 20-30
DICK, D.: s. RENNER, F. 1992
DIMITROV, D. (1994): A record of *Achaearanea tabulata* from the Balkan Peninsula (Araneae: Theridiidae). - Heft 8: 77-79
DRÖSCHMEISTER, R. (1995): Erstnachweis von *Carniella brignolii* (Araneae: Theridiidae) für Deutschland. - Heft 10: 15-16
DROGLA, R. & T.BLICK [& Mitarbeiter*] (1996): Rote Liste der Pseudoskorpione Deutschlands (Arachnida: Pseudoscorpiones). - Heft 11: 36-38
DROGLA, R. & K.LIPPOLD (1994): Neunachweise von Pseudoskorpionen in den neuen Bundesländern Deutschlands (Arachnida: Pseudoscorpiones). - Heft 8: 75-76
DUCHAC, V. (1993): Zwei neue Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik. - Heft 5: 36-38
FINCH, O.-D. [Autorreferat] (1996): Spinnen (Araneae) und Wegwespen (Hymenoptera: Pompilidae) eines nordwestdeutschen Binnendünenkomplexes. - Heft 11: 54-55
FINCH, O.-D. & W.SCHULTZ (1997): Ermittlung charakteristischer Spinnengemeinschaften von Biotoptypen am Beispiel der nordwestdeutschen Küstenregion. - Heft 14: 28-39
FISCHER, J. (1993): Wiederfunde der Springspinne *Sitticus saxicola* in Bayern (Araneae: Salticidae). - Heft 6: 34-35
FISCHER, J.: s. BLICK, T. et al. 1995, TÖPFER-HOFMANN, G. 1991
FLÜCKIGER, P.F.: s. HEER, X. 1995
FOECKLER, F.: s. BAUMANN, T. et al. 1992
FOELIX, R.F. (1993): Dr. H. Homann wird 99! [mit Bibliographie] - Heft 5: 1-3
FRAMENAU, V. (1995): *Gnaphosa inconspecta* und *Xysticus viduus*, zwei bemerkenswerte Spinnenfunde an der Oberen Isar (Regierungsbezirk Oberbayern) (Araneae: Gnaphosidae, Thomisidae). - Heft 10: 17-19
FRÜND, H.-C. (1995): Ein Nachweis von *Porrhomma microcavense* in Schleswig-Holstein. - Heft 9: 44-45
FRÜND, H.-C., J. GRABO, H.-D. REINKE, H.-B. SCHIKORA & W. SCHULTZ (1994):Verzeichnis der Spinnen (Araneae) des nordwest-deutschen Tieflandes und Schleswig-Holsteins.- Heft 8: 1-46
FRÜND, H.-C.: s. LISKEN-KLEINMANS, A. 1997
GACK, C.: s. KOBEL-LAMPARSKI, A. et al. 1993
GRABO, J.: s. FRÜND, H.-C. et al. 1994

GUTBERLET, V. (1997): Untersuchungen zur Spinnenzönose (Araneae) der Stamm- und Kronenregion von Eichen unterschiedlich genutzter Waldstandorte unter Verwendung des Ökotypensystems nach PLATEN. - Heft 14: 16-27
HÄNGGI, A. (1992): Spinnenfänge in Magerwiesen und Brachen aus dem Tessin - unkommentierte Artenlisten. - Heft 4: 59-78
HÄNGGI, A. (1993): Nachträge zum „Katalog der schweizerischen Spinnen" - 1. Neunachweise von 1990 bis 1993. - Heft 6: 2-11
HAMMELBACHER, K.: s. BLICK, T. 1994
HARMS, K.H. (1994): Ein Nachweis von *Talavera inopinata* in Deutschland (Araneae: Salticidae). - Heft 8: 53
HAJER, J.: s. RUZICKA, V. 1996
HEER, X. (1997): Beobachtungen zu *Troxochrus nasutus* (Araneae: Linyphiidae). - Heft 14: 81-83
HEER, X. & P.F. FLÜCKIGER (1995): Erstnachweis von *Pseudomaro aenigmaticus* (Araneae: Linyphiidae) und weitere Funde von *Philodromus praedatus* (Araneae: Philodromidae) in der Schweiz. - Heft 10: 25-27
HENDRICKS, K.: s. BLICK, T. 1995
HENSCHEL, J. (1995): Ein handliches Vakuumsammelgerät für die Erfassung von Spinnen und Insekten. - Heft 9: 67-70
HÖSER, N. (1992): Befunde zur Habitatpräferenz der Wespenspinne, *Argiope bruennichi*. - Heft 3: 54-56
HOLSTEIN, J. (1996): Wiederfund von *Sitticus terebratus* (CLERCK, 1757) in Deutschland (Araneae: Salticidae). - Heft 11: 52-53
HOLL, A.: s. POPPE, S. 1995
HOMANN, H.: s. FOELIX, R.F. 1993 - vgl. auch Heft 6: 1
JÄGER, P. (1994): Zweiter Nachweis von *Porrhomma microcavense* (Araneae: Linyphiidae) in Nordrhein-Westfalen (Deutschland). - Heft 7: 52
JÄGER, P. (1995): Spinnenaufsammlungen aus Ostösterreich mit vier Erstnachweisen für Österreich. - Heft 9: 12-25
JÄGER, P. (1995): Erstnachweise von *Macaroeris nidicolens* und *Icius subinermis* für Deutschland in Köln (Araneae: Salticidae). - Heft 9: 38-39
JÄGER, P. (1995): Erstnachweis von *Holocnemus pluchei* und zweiter Nachweis von *Nesticus eremita* für Deutschland in Köln (Araneae: Pholcidae, Nesticidae). - Heft 10: 23-24
JÄGER, P.: s. KRAFFT, B. 1997
JEDLIČKOVÁ, J. (1996): Einige seltene Spinnenarten aus der Slowakei (Araneae). - Heft 12: 61-65
JONSSON, L.J. (1993): Nachweis von *Uloborus plumipes* in einem Gewächshaus in Niedersachsen. - Heft 6: 42-43
JONSSON, L.J. (1995): Distribution and habitat of *Pocadicnemis pumila* and *P. juncea* (Araneae: Linyphiidae) in Sweden. - Heft 9: 46-48
KILCHLING, K. (1994): Erster Nachweis von *Episinus maculipes* in Deutschland (Araneae: Theridiidae). - Heft 8: 54-55
KLAPKAREK, N. & U. RIECKEN (1995): Zur Verbreitung und Autökologie von *Collinsia submissa* (Araneae: Linyphiidae). - Heft 9: 49-56
KLAPKAREK, N.: s. BLICK, T. 1993
KLIMEŠ, L. & P. BEZDĚCKA (1995): *Egaenus convexus* - eine neue Weberknechtart aus der Tschechischen Republik. - Heft 10: 32-33

KLOID, P. (1994): Erstnachweis von *Theridion hannoniae* für Deutschland (Araneae: Theridiidae). - Heft 8: 56-57
KNEITZ, S. [Autorreferat] (1992): Vergleich der Spinnenfauna (Arachnida: Araneae) in unterschiedlich bewirtschafteten Weinbergen in Mainstockheim bei Kitzingen. - Heft 3: 64-65
KOBEL-LAMPARSKI, A., C. GACK & F. LAMPARSKI (1993): Einfluß des Grünmulchens auf die epigäischen Spinnen in Rebflächen des Kaiserstuhls. - Heft 5: 15-32
KORGE, H.: s. BRUHN, K. et al. 1994
KRAFFT, B. & P.JÄGER (1997): In memoriam Ernst Kullmann, 1931 - 1996 [mit Bibliographie]. - Heft 13: 1-8
KRAUS, O. (1991): In memoriam Herbert Casemir [mit Bibliographie]. - Heft 1: 1-4 [Nachträge zur Bibliographie: Heft 2: 46; Heft 3: 68]
KREUELS, M. (1997): Eine bemerkenswerte Beobachtung zur physikalischen Netz -Eigenschaft der Gattung *Eresus* WALCKENAER 1805 (Araneae: Eresidae), gewonnen bei einem Versuch zur Protein-Sequenzierung von Spinnenseide. - Heft 13: 48-50
KRIŠTÍN, A. & T. BAUMANN (1996): Zur Bedeutung von Weberknechten (Opiliones) in der Nestlingsnahrung. - Heft 11: 43-46
KRONESTEDT, T. (1997): Erstnachweis von *Aulonia kratochvili* (Araneae, Lycosidae) für Europa. - Heft 14: 77-80
KROPF, C. (1993): Ist das Zeigerwertsystem Ellenbergs zur autökologischen Charakterisierung von Spinnenarten geeignet? Beispielhafte Darstellung an der Bodenspinne *Comaroma simoni* (Arachnida, Araneae, Anapidae). - Heft 5: 4-14
KRUMPÁL, M.: s. KRUMPÁLOVÁ, Z. 1993
KRUMPÁLOVÁ, Z. & M.KRUMPÁL (1993): Funde von für die Slowakei neuen und seltenen Spinnentierarten (Arachnoidea). - Heft 6: 36-41
KULLMANN, E.: s. KRAFFT, B. 1997
LAMPARSKI, F.: s. KOBEL-LAMPARSKI, A. et al. 1993
LISKEN-KLEINMANS, A. (1995): Wie verändert Flubereinigung und intensive Bearbeitung im Weinberg die Zönose der epigäischen Spinnen? - Heft 10: 1-10
LISKEN-KLEINMANS, A. & H.-C.FRÜND (1997): Tagungsbericht zum Workshop "Autökologische Einstufung von Spinnen" am 23.11.96 auf Gut Sunder veranstaltet durch die Nordwestdeutsche Arachnologische Arbeitsgemeinschaft (NOWARA) unter der Leitung von A.LISKEN-KLEINMANS und H.-C.FRÜND. - Heft 14: 5-8
LIPPOLD, R.: s. DROGLA, K. 1994
LUKA, H.: s. BLICK, T. et al. 1996
MALT, S. [Autorreferat] (1991): Untersuchungen trophischer Beziehungen ausgewählter netzbauender Araneen in Halbtrockenrasen des NSG „Leutratal" bei Jena. - Heft 1: 89-90
MALT, S. [Autorreferat] (1996): Untersuchungen zur Rolle ausgewählter netzbauender Spinnen (Araneae) im trophischen Beziehungsgefüge von Halbtrockenrasen. - Heft 12: 70-74
MALTEN, A. (1991): Über *Opilio canestrinii*. - Heft 1: 81-83
MALTEN, A. (1994): Fünf für Deutschland neue Spinnenarten - *Lepthyphantes midas*, *Neriene furtiva*, *Hahnia petrobia*, *Clubiona leucaspis*, *Diaea pictilis* (Araneae: Linyphiidae, Hahniidae, Clubionidae, Thomisidae). - Heft 8: 58-62
MALTEN, A.: s. PLATEN, R. et al. 1996
MARTENS, J.: s. BLISS, P. et al. 1996

MARTIN, D. (1991): Zur Autökologie der Spinnen (Arachnida: Araneae). I. Charakteristik der Habitatausstattung und Präferenzverhalten epigäischer Spinnenarten. - Heft 1: 5-26
MARTIN, D.: s. BLICK, T. et al. 1993
MERKENS, S. (1995): Erster Nachweis von *Carorita paludosa* in Deutschland (Araneae: Linyphiidae). - Heft 9: 40-41
MOLENDA, R.: s. BLICK, T. et al. 1995
MÜLLER, M. [Autorreferat] (1992): Vergleichende morphologische Untersuchungen zum Sexualdimorphismus bei Webspinnen (Arachnida: Araneae). - Heft 3: 62-63
PEKÁR, S. (1997): Changes in epigeic spider community in primary succession on a brown-coal dump. - Heft 14: 40-50
PFIFFNER, L.: s. BLICK, T. et al. 1996
PLATEN, R. [Autorreferat] (1991): Struktur der Spinnen- und Laufkäferfauna (Arach.: Araneida, Col.: Carabidae) anthropogen beeinflußter Moorstandorte in Berlin (West); taxonomische, räumliche und zeitliche Aspekte. - Heft 1: 90-91
PLATEN, R. (1996): Spinnengemeinschaften mitteleuropäischer Kulturbiotope. - Heft 12: 1-45
PLATEN, R., T.BLICK, P.SACHER & A.MALTEN [& Mitarbeiter*](1996): Rote Liste der Webspinnen Deutschlands (Arachnida: Araneae). - Heft 11: 5-31
POPPE, S. & A.HOLL (1995): Ernährungsbiologie und Nahrungsspektrum der Gerandeten Jagdspinne *Dolomedes fimbriatus* (Araneae: Pisauridae). - Heft 9: 1-11
POZZI, S. (1997): Spinnenfänge aus Magerwiesen der Kantone Genf und Waadt (Schweiz) - Unkommentierte Artenlisten. - Heft 14: 51-76
RATSCHKER, U. [Referent: H. Bellmann] (1993): Untersuchungen zur Bionomie, Taxonomie und Verbreitung von *Eresus niger* (Petagna, 1787) (Araneae: Eresidae). - Heft 6: 49-50
REICHE, W.& G.SCHMIDT (1994): Weitere Nachweise von *Uloborus plumipes* in Deutschland. - Heft 7: 50-51
REINKE, H.D.: s. FRÜND, H.C. et al. 1994
RELYS, V. (1994): Unkommentierte Liste der Spinnen Litauens (Araneae). - Heft 7: 1-19
RELYS, V.: s. SPUNGIS, V. 1997
RENNER, F. (1992): Liste der Spinnen Baden-Württembergs (Araneae). Teil 1: Bibliographie und Liste der Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae und Mysmenidae. - Heft 3: 14-53
(unter Mitarbeit von K.H.HARMS, E.BAUCHHENSS, H.BELLMANN, T.BLICK, C.GACK, A.HÄNGGI, J.KIECHLE, A.KOBEL-LAMPARSKI, N.LEIST, A.MALTEN, D.NÄHRIG, R.PLATEN, W.ROSE, G.[GÜNTER] SCHMIDT, G.TÖPFER-HOFMANN, A.WOLF, J.WUNDERLICH)
RENNER, F. (1992): Liste der Spinnen Baden-Württembergs (Araneae). Teil 2: Liste der Spinnen Baden-Württembergs excl. Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae und Mysmenidae. - Heft 4: 21-55
(unter Mitarbeit von K.H.HARMS, E.BAUCHHENSS, H.BELLMANN, T.BLICK, C.GACK, A.HÄNGGI, J.KIECHLE, A.KOBEL-LAMPARSKI, N.LEIST, A.MALTEN, D.NÄHRIG, R.PLATEN, W.ROSE, G.[GÜNTER] SCHMIDT, G.TÖPFER-HOFMANN, A.WOLF, J.WUNDERLICH)
RENNER, F. & D.DICK (1992): Spinnen in der Nestlingsnahrung von Rabenkrähen. - Heft 3: 57-58
RIECKEN, U.: s. KLAPKAREK, N. 1995
RUZICKA, V. (1992): Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites in Bohemia (so-called „rock cities"). - Heft 3: 1-13

RUZICKA, V. & J. HAJER (1996): Spiders (Araneae) of stony debris in North Bohemia. - Heft 12: 46-56
SACHER, P. (1991): Bemerkungen zu zwei Nachweisen von *Gibbaranea ullrichi*. - Heft 1: 85-86
SACHER, P. (1991): Funde von *Zygiella stroemi* in Österreich. - Heft 2: 35-36
SACHER, P. (1993): *Xysticus lineatus* in Thüringen (Araneae: Thomisidae). - Heft 6: 48
SACHER, P. (1995): Wiederbestätigung von *Metapanamomops kaestneri* für Deutschland (Araneae: Linyphiidae). - Heft 9: 42-43
SACHER, P. (1996): Nachweis von *Mecynargus morulus* im Harz - eine Wiederbestätigung für Deutschland (Araneae: Linyphiidae: Erigoninae). - Heft 12: 66-67
SACHER, P. & R.BELLSTEDT (1997): *Tetragnatha shoshone* auch in Thüringen. - Heft 13: 51-52
SACHER, P.: s. BAUMANN, T. et al. 1996; BRUHN, K. et al. 1994; PLATEN, R. et al. 1996
SAMMOREY, T.: s. BLICK, T. et al. 1993
SCHEIDLER, M.: s. BLICK, T. 1991
SCHIKORA, H.-B. (1994): *Entelecara omissa* neu für Deutschland (Araneae: Linyphiidae). - Heft 8: 63-64
SCHIKORA, H.-B.: s. FRÜND, H.-C. et al. 1994
SCHLEGEL, D. & T.BLICK (1991): Pseudoskorpione an Waldrändern bei Feuchtwangen. - Heft 1: 87-88
SCHLEUTER, M.: s. BAUMANN, T. et al. 1992
SCHMARDA, T. (1995): *Chernes nigrimanus* - eine für die Tschechische Republik neue Pseudoskorpionart (Pseudoscorpiones: Chernetidae). - Heft 9: 61-66
SCHMIDT, G. [Gerd] (1994): *Caracladus avicola* und *Erigone tirolensis* neu für Deutschland (Araneae: Linyphiidae). - Heft 8: 65-66
SCHMIDT, G. [Günter] (1991): Gehört *Hasarius adansoni* zur deutschen Fauna? - Heft 2: 37
SCHMIDT, G. [Günter]: s. REICHE, W. 1994
SCHNITTER, P.H. [Referent: P.Bliss] (1991): Untersuchungen ausgewählter Arthropodenzönosen von Saumbiotopen zwischen Trockenrasen- und Agroökosystemen. - Heft 2: 38-39
SCHULTZ, W.: s. FRÜND, H.-C. et al. 1994; FINCH, O.-D. 1997
SEGERS, H.: s. BLICK, T. 1993
SIMON, U. (1997): On the biology of *Dipoena torva* (Araneae: Theridiidae). - Heft 13: 29-40
SMIT, J. (1997): Die epigäische Spinnenzönose (Araneae) auf Schotterbänken der Mittelgebirgsbäche und -flüsse im Rheinischen Schiefergebirge. - Heft 13: 9-28
SPUNGIS, V. & V.RELYS (1997): In memoriam Maris Sternbergs, 1940-1996 [mit Bibliographie]. - Heft 14: 1-4
STAUDT, A. (1996): Neue Funde der Springspinne *Talavera inopinata* (Araneae: Salticidae) im Saarland. - Heft 11: 47:48
STERNBERG, M.: s. SPUNGIS, V. 1997
STUMPF, H. (1994): Nachweis von *Linyphia alpicola* in Deutschland (Araneae: Linyphiidae). - Heft 8: 67-68
STUMPF, H. (1995): *Lathys nielseni* - neu für Deutschland (Araneae: Dictynidae). - Heft 10: 25-27
STUMPF, H.: s. BAUCHHENSS, E. 1992
SZINETÁR, C.: s. BLICK, T. 1996
TEICHMANN, B.: s. BAUMANN, T. et al. 1996

TÖPFER-HOFMANN, G. & J.FISCHER (1991): Wiederfunde der Springspinne *Carrhotus xanthogramma* (Latreille, 1819) in Bayern. - Heft 2: 33-34
TOTH, F.: s. BAUCHHENSS, E. et. al. 1997
TRAUTNER, J. (1994): Zum Beutespektrum von *Gnaphosa lucifuga* (Araneae: Gnaphosidae). - Heft 7: 41-44
WALTER, J.E. (1995): Quatremère-D'Isjonval - auch ein Spinnenforscher. - Heft 9: 71-74
WEISS, I. (1997): Ein weiterer Nachweis von *Porrhomma myops* für Deutschland (Araneae: Linyphiidae). - Heft 13: 41-42
WEISS, I. & E.BAUCHHENSS (1995): *Centromerus silvicola* und *C. sellarius* (*C. similis*) - eine nomenklatorische Richtigstellung. - Heft 10: 28-31
WEISS, I.: s. BAUCHHENSS, E. et al. 1997; BLICK, T. et al. 1995
WOHLGEMUTH-VON REICHE, D. (1997): Darstellungsmöglichkeit der Zugehörigkeit von Spinnenzönosen zu Pflanzenformationen. Mit einem Beispiel aus der Auenlandschaft im Nationalpark 'Unteres Odertal'. - Heft 14: 9-15
WUNDERLICH, J. (1994): Bemerkenswerte Spinnen der rezenten und fossilen Faunen Mitteleuropas und ihre biogeographischen Beziehungen zu den Tropen und Subtropen (Arachnida: Araneae). - Heft 7: 53-55
WUNDERLICH, J. (1994): *Micaria albimana* - eine für Deutschland neue Art der Ameisen-Plattbauchspinnen (Araneae: Gnaphosidae). - Heft 8: 69-70